




#NATUURINJETUIN

BROEIHOOP VOOR RINGSLANGEN MAKEN

Komen er in jouw omgeving ringslangen voor? Maak dan een broeihoop voor de ringslang. Dit is de grootste, niet-giftige slang die in Nederland voorkomt. De ringslang is te herkennen aan gele vlekken achter haar kop. Ringslangen hebben al jaren de status 'kwetsbaar' op de rode lijst van bedreigde soorten. De broeihopen zijn belangrijk voor de voorplanting van de ringslang. Goed om te onthouden bij het maken van een broeihoop is dat het materiaal in de hoop los moet zitten, zodat de slang zich er makkelijk doorheen kan bewegen. Ringslangen leggen vaak 20-30 eieren per legsel in een broeihoop.



Landschapsbeheer Drenthe

Een broeihoop bestaat uit plantaardig materiaal met een temperatuur van circa 20–25° C. Hierin legt een vrouwtje in juni/juli twintig tot dertig eieren, die door een constante temperatuur uitkomen. Gebruik voor het aanleggen van een broeihoop bij voorkeur gebiedseigen materiaal.

Wat heb je nodig?

- Takken
- Bladeren
- Riet
- Compost
- Ruige mest
- Gemaaid gras
- Sloomateriaal (geen zand)

De juiste plaats

Kies voor de aanleg van de broeihoop een rustige, beschutte plaats. Bij voorkeur langs een bos, haag of houtwal. Plaats de broeihoop in ieder geval niet in de buurt van een weg. Kies het liefst voor een plek in de halfschaduw. Dit voorkomt dat in perioden met veel zon en droogte de hoop te veel uitdroogt en onvoldoende broeit. Het is nog beter om twee broeihopen te maken: een in de zon en een in de (half) schaduw. Het is tevens van groot belang dat de hoop voldoende vochtig blijft. **Tip!** Zet een raster om de broeihoop als er dieren grazen.



Aan de slag

Houd bij het aanleggen van de broeihoop rekening met de uiteindelijke maat: zo'n twee bij drie meter omvang en minimaal anderhalf meter hoog. Gebruik meer materiaal dan de gewenste grootte, want de broeihoop slinkt in de loop van de tijd in. Om de temperatuur het hele jaar stabiel te houden, is een ronde vorm en het gebruik van verschillende materialen aan te raden.

Voorzie de bodem van de broeihoop met een laag (50 cm) takken, zodat de ringslang een ingang heeft om naar binnen te komen. Plaats daarboven het overige materiaal en zorg dat er een bult ontstaat. Het is de bedoeling dat er een constante temperatuur ontstaat door het verteringsproces waarbij warmte vrijkomt. Bij deze temperaturen komen de eieren in circa vier weken uit.



We adviseren de broeihoop eens per jaar om te zetten. Dit betekent dat je de oude hoop afbreekt, eventueel de ei-resten verzamelt, en het materiaal gebruikt voor een nieuwe broeihoop. Dit hergebruik kan maar één keer, want na twee jaar moet het materiaal worden vervangen. Het onderhoud moet plaatsvinden tussen oktober en mei. **Tip!** Je kunt de hoop het beste omzetten in oktober of november. In theorie wordt de hoop dan nog niet gebruikt als overwinteringsplaats en vindt geen verstoring plaats van mogelijke legfels.